

5 x 10⁷ KBE/ml

Schmackhafte, probiotische und prebiotische Suspension zum Eingeben für Zierkaninchen, Meerschweinchen und andere Kleinnager, Frettchen, Reptilien und Ziervögel.

Name und Anschrift des Pharmazeutischen Unternehmers:

Dechra Veterinary Products Deutschland GmbH, Hauptstraße 6 - 8, 88326 Aulendorf

Zusammensetzung: 1 ml Suspension enthält:

Wirkstoffe: Enterococcus faecium 5 x 10⁷ KBE.

Sonstige Bestandteile: Oligosaccharide, Pflanzenöl, α-Tocopherolacetat.

Anwendungsgebiete:

Zur Therapie und Prophylaxe von Durchfallerkrankungen, zur Stabilisierung der Darmflora in Stresssituationen sowie während und nach Antibiotikabehandlung, zur Stärkung der allgemeinen Abwehrkraft.

Gegenanzeigen:

Überempfindlichkeit gegenüber Bestandteilen des Arzneimittels.

Nebenwirkungen:

Keine bekannt. Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, bei Ihrem Tier/Ihren Tieren feststellen, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

Zieltierarten:

Zierkaninchen, Meerschweinchen und andere Kleinnager, Frettchen, Reptilien und Ziervögel.

Dosierung für jede Zieltierart, Art und Dauer der Anwendung:

Schmackhafte Suspension zum Eingeben.

Zierkaninchen, Meerschweinchen und andere Kleinnager, Frettchen, Reptilien und Ziervögel: 1 ml/kg Körpergewicht 2-mal täglich. Sehr kleine Ziervögel (Kanarien, Wellensittiche) erhalten 0,05 ml (entspricht 1 Tropfen) 2-mal täglich. Die Verabreichung erfolgt über 5 Tage bzw. mind. 3 Tage über die Besserung hinaus. Falls erforderlich kann ProPre-Bac® auch dauerhaft mit der Dosis von 1 ml/kg Körpergewicht 1-mal täglich angewandt werden. Die Gabe erfolgt direkt in den Mund bzw. Schnabel des Tieres oder über schmackhaftes Futter. Während einer oralen Antibiotika-Therapie sollte die Verabreichung von ProPre-Bac® in einem Abstand von mind. 2 Stunden getrennt erfolgen.

Hinweise für die richtige Anwendung:

Siehe auch unter „Dosierung, Art und Dauer der Anwendung“. Flasche vor Gebrauch gut schütteln. Zur Entnahme der Suspension Verschlusskappe abdrehen und Dosierspritze in Flaschenöffnung stecken. Flasche auf den Kopf drehen und das für eine Verabreichung erforderliche Volumen in die Spritze aufziehen. Bei Eingabe in den Mund den Kopf des Tieres nicht hochhalten, damit es gut Abschlucken kann. Nach Verabreichung Spritze gründlich mit Wasser ausspülen und trocknen lassen. Flasche nach Entnahme verschließen.

Wartezeit: Entfällt. Nicht bei Tieren anwenden, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen.

Besondere Lagerungshinweise:

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Nicht über 25 °C lagern. Nach dem Öffnen 2 Monate haltbar. Das Arzneimittel nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr anwenden.

Besondere Warnhinweise: Keine Angaben

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Entsorgung nicht verwendeter Arzneimittel oder von Abfallmaterialien:

Nicht aufgebrauchte Tierarzneimittel sind vorzugsweise bei Schadstoffsammelstellen abzugeben. Bei gemeinsamer Entsorgung mit dem Hausmüll ist sicherzustellen, dass kein missbräuchlicher Zugriff auf diese Abfälle erfolgen kann. Tierarzneimittel dürfen nicht mit dem Abwasser bzw. über die Kanalisation entsorgt werden.

Weitere Angaben:

Packungsgröße 50 ml-Flasche in einem Umkarton Packung enthält Dosierspritze.