

Für Ziervögel, Brieftauben, Kleinnager, nicht der Lebensmittelgewinnung dienende Kaninchen, Frettchen und Terrarientiere (Reptilien)

Pulver zum Eingeben

#### Wirkstoffe in 1 g Pulver:

*Lactobacillus fermentum*, gefriergetrocknet, ATCC Nr. 14931; *Lactobacillus casei*, gefriergetrocknet, ATCC Nr. 7469; *Enterococcus* Nettoinhalt: 127 g *faecium* M-74, gefriergetrocknet, ATCC Nr. 19434; *Lactobacillus plantarum*, gefriergetrocknet, ATCC Nr. 14917; *Lactobacillus acidophilus*, gefriergetrocknet, ATCC Nr. 4356; *Pediococcus acidilactici*, gefriergetrocknet, ATCC Nr. 25740; *Bifidobacterium bifidum*, gefriergetrocknet, ATCC Nr. 15696; entspr. insgesamt 25 Mio. KBE\*/g (\*= Kolonie-bildende Einheiten). Sonstige Bestandteile: Fructooligosaccharide, Maltodextrin, Glucose, Natrium-Aluminium-silicat.

#### Anwendungsgebiete:

Unterstützende Behandlung von Diarrhoe (Durchfall) und Infektionskrankheiten; Stabilisierung der Darmflora in Stresssituationen, bei Futterumstellung, Aufzucht und während/nach Antiinfektivtherapie.

#### Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Folgende Mengen Bene-Bac Pulver werden unter das Futter gemischt:

Körpergewicht	Pulvermenge pro Tag		
bis 50 g	0,325 g	= 1/8 gestr. Teelöffel	= 1/2 Messlöffel
50 – 250 g	0,65 g	= 1/4 gestr. Teelöffel	= 1 Messlöffel
250 – 1000 g	1,3 g	= 1/2 gestr. Teelöffel	= 2 Messlöffel
> 1000g	2,6 g	= 1 gestr. Teelöffel	= 4 Messlöffel

Unterstützende Behandlung der Diarrhoe: Täglich bis einige Tage nach klinischer Besserung.

Zusatztherapie in Stresssituationen: 2-mal im Abstand von 3 Tagen vor Futterumstellung bzw. zu erwartender Stresssituation sowie weitere 2-mal danach verabreichen. Während/ nach Antiinfektiva-Therapie: Täglich/alle 2 Tage bis einige Tage nach Absetzen des Antiinfektivums.

Erhaltung der Widerstandskraft/Während der Aufzucht: 1-mal wöchentlich. Bene-Bac Pulver kann über Feuchtfutter und Obst gestreut werden. Zur besseren Haftung des Pulvers kann Trockenfutter mit Wasser oder Speiseöl angefeuchtet werden. Behandeltes Futter max. 8 Stunden anbieten, danach entfernen. Leere Futtergefäße gründlich reinigen.

#### Gegenanzeigen/Nebenwirkungen:

Keine bekannt. Falls Nebenwirkungen auftreten sollten, bitte dem Tierarzt oder Apotheker melden.

#### Lagerungshinweis:

Unter 25 °C aufbewahren. Vor Feuchtigkeit schützen. Nach Ablauf des auf dem Behältnis angegebenen Verfalldatums nicht mehr anwenden. Nicht aufgebrauchte Tierarzneimittel sind zusammen mit dem Hausmüll zu entsorgen. Es ist sicherzustellen, dass hierbei kein missbräuchlicher Zugriff auf diese Abfälle erfolgen kann.

Nicht bei Tieren anwenden, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.