

ELEKTROLYT-TRÄNKE OHNE KOMPROMISSE

Ein gesunder Start ins Leben ist die Voraussetzung für leistungsstarke Milchkühe und eine gute Mastleistung. In den ersten Lebenswochen kommt es bei Kälbern jedoch häufig zu Durchfall. Es drohen Gedeihstörungen und wirtschaftliche Einbußen.

In solchen Fällen hat sich das Diät-Ergänzungsfutter **LYTAFIT®** von Dechra bewährt:

Die isotonische Tränke stabilisiert gezielt den Wasser- und Nährstoffhaushalt von Saugkälbern.

LYTAFIT® enthält nur das, was ein Durchfallkalb wirklich braucht und belastet den Organismus nicht mit unnötigen Zusatzstoffen.

LYTAFIT® ist je nach Bedarf in drei praktischen Handelsformen mit Messlöffel erhältlich. (1 kg/26 Liter, 3,75 kg/100 Liter, 5 kg/133 Liter).



BASISINFORMATIONEN (nur Kalb)

LYTAFIT® Diät-Ergänzungs- und Diät-Alleinfuttermittel für Aufzuchtälber (Saugkälber), Ergänzungsfuttermittel für Ferkel (Saugferkel und abgesetzte Ferkel)

Zur Stabilisierung des Wasser- und Elektrolythaushalts. Enthält vorwiegend Elektrolyte (Natrium, Kalium, Chloride) und leicht verfügbare Kohlenhydrate (Glucose).

Analytische Bestandteile: Rohprotein 10 %, Rohasche 15 %, Calcium 0,134 %, Natrium 4,98 %, Kalium 1,3 %, Magnesium 0,05 %, Chloride 4,3 %, Lysin 0 %, Methionin 0 %. Pufferkapazität: mind. 66 mmol/Liter verfütterungsfertige Tränkeportion (berechnet nach der SID-Methode).

Zusammensetzung: Glucose, Natriumbicarbonat, Laktose, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumgluconat, Magnesiumchlorid.

Zusatzstoffe je kg: Sensorische Zusatzstoffe: Aromavormischung mit Glycin.

Sachgerechte Verwendung: Es wird empfohlen, vor der Verfütterung den Rat eines Tierarztes oder einer Tierärztin einzuholen.

Als Zwischentränke: Dosierung: 1 gestr. Messlöffel (37,5 g) LYTAFIT®-Pulver in 1 Liter warmem Wasser auflösen.

Fütterungsempfehlung: Morgens und abends Milch bzw. MAT tränken, dazu zwischendurch bis zu 3 x 2-3 Liter LYTAFIT®-Lösung in Wasser tränken.

Gesamtdauer der Verfütterung: Als Alleinfutter: 1 bis max. 3 Tage. Als Ergänzungsfutter in Kombination mit Milch oder MAT: bis die Kotbeschaffenheit wieder normal ist, maximal jedoch 7 Tage.

Direkt-in-Milch („Orale Rehydrationsmethode Leipzig“): Dosierung: 1 gestr. Messlöffel (37,5 g) LYTAFIT®-Pulver in 1 Liter warmer Milch bzw. MAT auflösen.

Fütterungsempfehlung: Morgens, mittags, abends je 2 Liter Milch bzw. MAT mit Zusatz von LYTAFIT®-Pulver tränken.

Achtung: Es muss über 24 h ständig Wasser zur freien Aufnahme zur Verfügung stehen und selbstständig getrunken werden.

Gesamtdauer der Verfütterung: Die „Direkt-in-Milch“-Methode ergibt eine vollwertige und hochenergetische Tränke.

Diese Tränke wird so lange verfüttert, bis die Kotbeschaffenheit wieder normal ist, maximal jedoch 7 Tage.

Weitere Informationen finden Sie hier:



LYTAFIT®

Dechra Veterinary Products Deutschland GmbH,
Hauptstr. 6-8, 88326 Aulendorf
www.dechra.de
Österreich: Dechra Veterinary Products GmbH,
Hintere Achmühlerstraße 1a, A-6850 Dornbirn
www.dechra.at



LYTAFIT®

GIBT IHREM KALB ZURÜCK, WAS ES VERLIERT.



VORTEILE VON LYTAFIT® BEI KÄLBERDURCHFALL



Hohe Wasseraufnahme



Stabilisierung von Elektrolythaushalt und physiologischer Verdauung



Schnell verfügbare Energie



QS-Siegel und TÜV-zertifiziert

LYTAFIT® bietet diese kombinierten Vorteile und ist einfach und preiswert in der Anwendung. Die Elektrolyt-Tränke ist mit der Labmagenverdauung kompatibel und kann wahlweise als Zwischen tränke in Wasser oder direkt in die Milch gegeben werden. Das bietet viele Vorteile gerade bei durchfallerkrankten Kälbern. Denn die LYTAFIT®-Milch-Tränke ist hochenergetisch und dabei gut verträglich. Ein Anwendungs- und Abgabebeleg ist nicht erforderlich.

FÜTTERUNGSEMPFEHLUNGEN

Um nicht auszutrocknen, sollten Durchfallkälber ca. 8-10 Liter Flüssigkeit pro Tag aufnehmen. Etwa die Hälfte davon sollte mit der isotonischen Elektrolyt-Tränke LYTAFIT® verabreicht werden.

LYTAFIT® als Zwischen tränke in Wasser:

Morgens und abends je 3 Liter Milch oder MAT. Zwischendurch bis zu 3x je 2-3 Liter LYTAFIT® in Wasser anbieten.



Morgens/abends:
3 Liter Milch/MAT

3x 2-3 Liter LYTAFIT®
in Wasser

Orale Rehydrationsmethode Leipzig:

Z. B. morgens, mittags und abends 2 Liter Milch + 2 Messlöffel LYTAFIT® (= 75 g) bis die Kotbeschaffenheit wieder normal ist bzw. max. 7 Tage. Wichtig: Freier Zugang zu Wasser sowie dessen kontrollierte Aufnahme.



Morgens/mittags/abends:
LYTAFIT® in 2 Litern Milch/MAT

Wasser zur
freien Verfügung



Studien der Universität Leipzig zeigen: Kälber, die mit LYTAFIT® in Milch gefüttert wurden, nehmen während der Durchfallperiode mehr Wasser auf und verzeichnen höhere Gewichtszunahmen als andere Kälbergruppen, die Milch und Elektrolyte getrennt voneinander erhalten haben.*

* Bachmann L, Homeier T, Arlt S et al. (2009): Influence of different oral rehydration solutions on abomasal conditions and the acid-base status of suckling calves. J Dairy Sci 92: 1649-1659.