

Dimeticon Albrecht®



70,0 mg/ml Emulsion zum Eingeben
Für Zierkaninchen, Meerschweinchen und andere Kleinnager, Frettchen

Name und Anschrift des Pharmazeutischen Unternehmers:

Dechra Veterinary Products Deutschland GmbH, Hauptstraße 6 - 8, 88326 Aulendorf

Zusammensetzung: 1 ml Suspension enthält:

Wirkstoff: Dimeticon 70,0 mg
Sonstiger Bestandteil: Saccharose

Anwendungsgebiete:

- Übermäßige, auch feinschaumige Gasbildung im Magen-Darm-Bereich etwa verursacht durch mikrobielle und parasitäre Infektionen, Futtermittelunverträglichkeit und Fehlernährung
- Verstärkte Gasbildung nach Narkosen und Operationen#
- Hilfsmittel zur Diagnostik im Bauchbereich (Röntgen, Sonografie, Endoskopie).

Gegenanzeigen: Bekannte Überempfindlichkeit gegen Dimeticon oder einen der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels.

Nebenwirkungen: Keine bekannt. Falls Sie eine Nebenwirkung bei Ihrem Tier/Ihren Tieren feststellen, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt ist, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

Zieltierarten: Zierkaninchen, Meerschweinchen und andere Kleinnager, Frettchen

Dosierung, Art und Dauer der Anwendung: Schmackhafte Emulsion zum Eingeben.

Zierkaninchen, Meerschweinchen und andere Kleinnager, Frettchen: 0,5 – 1 ml/kg Körpergewicht 3 bis 6 mal täglich vorzugsweise direkt in den Mund des Tieres oder über das Trinkwasser verabreichen. Die Anwendung erfolgt in der Regel über einen bis mehrere Tage bzw. solange die Beschwerden bestehen. Dimeticon Albrecht® kann bei Bedarf auch über längere Zeit verabreicht werden.

Hinweise für die richtige Anwendung: Flasche vor Gebrauch gut schütteln. Zur Entnahme der Emulsion Verschlusskappe abdrehen und Dosierspritze in Flaschenöffnung stecken. Flasche auf den Kopf drehen und das für eine Verabreichung erforderliche Volumen in die Spritze aufziehen. Bei Eingabe den Kopf des Tieres nicht hochhalten, damit es gut abschlucken kann. Nach Verabreichung Spritze gründlich mit Wasser ausspülen und trocknen lassen. Flasche nach Entnahme verschließen.

Wartezeit: Entfällt. Nicht bei Tieren anwenden, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen.

Besondere Lagerungshinweise: Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren. Nicht über 25° C lagern. Nach dem Öffnen 3 Monate haltbar. Das Arzneimittel nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfallsdatums nicht mehr anwenden.

Besondere Warnhinweise:

Für Tiere mit Diabetes mellitus ist der Gehalt an Saccharose zu beachten.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Entsorgung nicht verwendeter Arzneimittel oder von Abfallmaterialien: Nicht aufgebrauchte Tierarzneimittel sind vorzugsweise bei Schadstoffsammelstellen abzugeben. Bei gemeinsamer Entsorgung mit dem Hausmüll ist sicherzustellen, dass kein missbräuchlicher Zugriff auf diese Abfälle erfolgen kann. Tierarzneimittel dürfen nicht mit dem Abwasser bzw. über die Kanalisation entsorgt werden.

Weitere Angaben: Packungsgröße 50 ml-Flasche in einem Umkarton. Die Packung enthält eine Dosierspritze.